

外用 宠物用

二氯苯醚菊酯吡虫啉滴剂说明书

【兽药名称】 通用名称：二氯苯醚菊酯吡虫啉滴剂
商品名称：汉宠宁
英文名称：Permethrin and Imidacloprid Spot-on Solutions
汉语拼音：Erlübenmijuzhi Bichonglin Diji

【主要成分】 二氯苯醚菊酯、吡虫啉

【性状】 本品为淡黄色至淡棕色液体。

【药理作用】 抗体外寄生虫药。

二氯苯醚菊酯属 I 型菊酯类杀虫剂、杀螨剂和驱虫剂，主要影响脊椎动物和无脊椎动物的电压依赖性钠通道，延迟和延长该通道激活与失活，导致寄生虫高度兴奋，直至死亡。吡虫啉为新一代氯代烟碱杀虫剂，对昆虫的中枢神经系统突触后烟碱型乙酰胆碱受体具较高亲和性，可抑制乙酰胆碱活性，导致寄生虫麻痹和死亡。对成年蚤和各个阶段幼蚤有效，对环境中幼蚤也有杀灭作用。二者联合使用，具有协同作用。

本品还可抑制蜱、白蛉、蚊子吸血，减少血媒性传染病的发生和传播。对蜱具有持续的杀灭和驱避活性，如对血红扇头蜱和篦子硬蜱可以持续四周、对网纹革蜱可以持续三周，进而降低了犬单核细胞埃利希体病的风险。对于单次给药治疗后的驱虫活性，巴浦白蛉可持续两周、恶毒白蛉三周、埃及伊蚊两周、尖音库蚊四周、厩蝇四周。

犬局部使用本品后，能迅速扩散到体表，治疗后4周动物体表和毛发均能检测到活性药物。

【适应证】 用于预防和治疗犬体表蚤、蜱、虱的寄生，抑制白蛉、厩蝇和蚊子的叮咬，并可用作辅助治疗因蚤引起的过敏性皮炎。

【用法与用量】 仅供皮肤外用。推荐使用的最小剂量：每1kg体重，吡虫啉10mg和二氯苯醚菊酯50mg。用药时犬应保持容易使用本品的姿势。分开犬毛至皮肤，将滴管前端抵住皮肤，挤出适量药液，最后用毛覆盖用药部位。

犬体重	规格	使用方法
≤4kg	0.4ml	取本品1支，滴于犬背部肩胛骨之间
4~10kg	1.0ml	取本品1支，滴于犬背部肩胛骨之间
10~25kg	2.5ml	取本品1支，滴于犬背部肩胛骨中间、后背臀部中间和前两点连线中间分两点，分四点给药。
25~50kg	4.0ml	取本品1支，滴于犬背部肩胛骨中间、后背臀部中间和前两点连线中间分两点，分四点给药。
≥50kg	4.0ml	取本品2支，滴于犬背部肩胛骨中间、后背臀部中间和前两点连线中间分两点，分四点给药。

预防或治疗期间，每月使用1次，可维持至少1个月有效。

【不良反应】 1. 按推荐用法与用量使用极少引发犬副作用；可能会引起一过性皮肤过敏或嗜睡。
2. 非常罕见情况下，犬对二氯苯醚菊酯可能会出现过敏反应，导致行为改变(情绪激动、烦躁、哀号或翻滚)、出现胃肠道症状(呕吐、腹泻、流涎、食欲不振)和神经系统症状(如运动障碍和抽搐)。这些症状通常为一过性反应，无需治疗。

【注意事项】 1. 怀孕及哺乳期的母犬亦可使用本品；病犬或体质虚弱的犬使用前需遵医嘱。
2. 本品在犬毛变湿时仍有效，但应避免长时间和大面积浸泡，长时间浸泡可能会减少产品药效时间。若犬需要洗澡，最好在使用本品至少两周后进行以确保疗效。
3. 本品仅用于宠物犬，七周龄以下或体重小于1.5kg的幼犬勿用。对本品过敏的犬勿用。
4. 本品仅用于未受损皮肤。使用过程中避免滴管内容物接触犬的眼或嘴，避免犬及其他动物因舔舐用药部位而误食本品。
5. 本品勿用于猫。
6. 用药前已经附着在犬身上的蜱虫，在用药后2日内可能清除不掉，所以应在用药时同时清除蜱，以防止其继续附着在犬身上吸血。

外用 宠物用

二氯苯醚菊酯吡虫啉滴剂说明书

7. 咬虱感染后，建议兽医在治疗30日后进行检查，以确定犬是否需要二次治疗。
8. 本品中的溶剂有可能会污染皮革、纺织品、塑料和表面光滑的物品，在用药部位干燥以前，应防止接触用药部位。
9. 如犬有预期感染埃利希体病的风险，建议在预期感染的3日前使用本品。
10. 未使用完的兽药制剂应通过危险品收集中心进行处理，不得通过污水处理系统或与生活垃圾一起处理本品。本品对鱼和其他水生生物有害，勿将本品投入水中。接受治疗的犬应在至少2日内远离各类水生环境。
11. 本品对蜜蜂有毒。
12. 避免儿童接触。
13. 人如果误食本品，勿立即诱吐，应立即就医。若犬误服本品，应在兽医监督下对症治疗，目前尚无特效解毒剂。
14. 已知皮肤过敏者请勿做施药者；给药时请勿进食、饮水和吸烟；使用本品后，应清洗双手；本品吸入有害，勿吸入蒸气；避免皮肤、眼和嘴接触，如皮肤不慎接触，应立即用肥皂和水冲洗；如不慎溅入眼睛，应立即用大量流水冲洗；如皮肤或眼睛刺激性持续，或误食本品，请持说明书就医。
15. 本品易燃，勿在高温或明火处使用或贮藏本品。
16. 请勿冷冻。

【休 药 期】 无需制定。

【规 格】 (1) 0.4ml：二氯苯醚菊酯0.2g+吡虫啉0.04g
(2) 1.0ml：二氯苯醚菊酯0.5g+吡虫啉0.1g
(3) 2.5ml：二氯苯醚菊酯1.25g+吡虫啉0.25g

【包 装】 3支/盒

【贮 藏】 密封保存。

【有 效 期】 60个月。

【批 准 文 号】 (1) 0.4ml：兽药字090413236
(2) 1.0ml：兽药字090413237
(3) 2.5ml：兽药字090413238

【生 产 企 业】 上海汉维生物医药科技有限公司

【地 址】 上海市金山工业区金争路855弄14号4幢

【邮 编】 201506

【电 话 / 传 真】 400-875-2220

【网 址】 www.hanvet.com